




### **AVALIAÇÃO DO REFLEXO VERMELHO: JUSTIFICATIVA E MOMENTOS IDEAIS PARA A SUA REALIZAÇÃO**

De acordo com Consenso da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, o TRV é o teste de triagem mais importante para identificar alterações na transparência da córnea, cristalino e vítreo, além de alterações na retina. Ele é capaz de identificar as principais causas de cegueira na infância. Esse exame deve ser realizado por pediatras, neonatologistas e médicos da saúde da família. As doenças facilmente identificadas pelo teste do olhinho são catarata congênita (causa importante de cegueira infantil) e o retinoblastoma. além disso, a retinopatia da prematuridade, glaucoma congênito, persistência da vasculatura fetal, doença de Coats, toxoplasmose, toxocaríase, hemorragia vítrea, coloboma e até altas ametropias podem ser identificadas pelo teste.

As recomendações da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica determinam a realização do TRV nas primeiras 72 h de vida, com reavaliações pelo pediatra assistente durante a puericultura, pelo menos 3 vezes ao ano, nos primeiros 3 anos de vida. A falha de visualização do RV ou a presença de qualquer anormalidade ocular são indicações para referência ao oftalmologista



**Fonte: Adaptado de Moorfields Eye Hospital**